

# மூலிகை வளர்ப்போம் பயன் பெறுவோம்



## 11. கண்டங்கத்தரி

தாவரவியல் பெயர்: *Solanum virginianum* Linn  
குடும்பம் : SOLANACEAE

சிங்களம் : கட்டுவெல்பட்டு  
சமஸ்கிருதம் : கண்டகாரி  
தமிழ் : கண்டங்கத்தரி  
ஆங்கிலம் :

பரம்பல் : வித்து  
மருந்துக்காக பயன்படும் பகுதிகள்:  
முழுத்தாவரம்

**அறிமுகம்**  
கண்டங்கத்தரி ஆயுர்வேதத்தில் சளி அல்லது கபத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மூலிகையாகும். முற்காலத்தில் இருந்து இலங்கையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருளாதார மதிப்பைக் கொண்ட ஒரு குறுகிய கால பயிராக கண்டங்கத்தரி அறியப்படுகிறது. இது இந்நாட்டில் விளைவிக்கக்கூடிய மூலிகையாகும். ஆனால் பெரும்பாலும் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை என்பது அரிஷ்டம், ஆசவம், க்வாதம், கிருதம் போன்ற அனைத்து மருந்துகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மருந்து. கடந்த காலத்தில்

இலங்கையின் தாழ்நில வறண்ட பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டது. இது இன்னும் சில பகுதிகளில் இயற்கையாகவே காணப்படுகிறது. இது மன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாணப் பகுதிகளில் காட்டுச் செடியாகக் காணப்படுகின்றது. பிரதான பயிர்களுக்கிடையிலான ஊடுபயிராக மிகவும் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை ஆகும்.

### தாவரவியல் விளக்கம்

இது ஒரு சிறிய புதர் செடியாகும் ஒட்டும் . கூர்மையான முட்களை உடையது 20cm உயரம் வரை வளரும். தரையில் இணையாக வளரும் கிளைகள் . எளிய .மஞ்சள் நிற கூர்மையான முட்கள் உள்ளன இலை10 செமீ நீளம் மற்றும் 9 செமீ அகலம் வரை வளரும். இலைகள் மற்றும் இலைக்காம்புகளில் கூர்மையான முட்களைக் கொண்டுள்ளன. மஞ்சரி பல ஊதா நிற பூக்களைக் கொண்டுள்ளது. வட்டமான பச்சை காய். பழம் பழுத்தவுடன் மஞ்சள் நிறமாக மாறும். இதில் மஞ்சள் வழுவுமுப்பான விதைகள் உள்ளன.

### விவசாய விளக்கம்

நன்கு பழுத்த கண்டங்கத்தரி பழங்களை உள்ளே உள்ள விதைகளுடன் சேர்த்து நன்கு உலர வைத்து விதைகள் பிரிக்கப்படும். ஒரு பழத்தில் சுமார் 350-425 விதைகள் உள்ளன விதைகளின் ஒட்டும் தன்மை . நீங்கும் வரை நன்கு கழுவி ஒரு நாள் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மணல் நாற்றங்கால் அல்லது தெளிப்பதன் மூலம் சாகுபடி செய்யலாம் நேரடியாக . நிலத்தில் நடப்பட்ட நாற்றுகள் சுமார் 10cm உயர்த்திய பிறகு 0.5-1 x 0.5-1 மீட்டர் இடைவெளியில் சுமார் 30x30x30cm ஆழமான குழிகளில் இரண்டு தேங்காய் சிரட்டை அளவு சேதன பசளை இட்டு நட வேண்டும் ஆரம்பத்தில் . நன்றாக தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும். செடி வளரும் போது படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும் தண்ணீரின் . அளவு கூடினால் பூஞ்சை தொற்று ஏற்படலாம் மேலும் உரம் மற்றும் சாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அறுவடையை அதிகரிக்கலாம்.

### அறுவடை மற்றும் சேமிப்பு

முழு தாவரமும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. நடவு

செய்து மூன்றரை மாதங்களுக்குப் பிறகு பழங்கள் முதிர்ச்சியடைந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறியதும் வெயிலுள்ள நாளில் செடியை அகற்றி நிழலில் உலர்த்தவும். மரங்களுக்கு இடையில் கயிறு கட்டி அதில் கழற்றிய செடிகளை தொங்கவிட்டு உலர்த்துவது வெற்றிகரமான முறை. ஒரு புதரில் இருந்து சுமார் 250 கிராம் கிடைக்கும். ஒரு ஹெக்டேர் சாகுபடியில் சுமார் 2500 கிலோகிராம் கிடைக்கும்.

**தற்போதைய பயன்பாடு மற்றும் சந்தை நிலைமை**  
2021 ஆம் ஆண்டின் தரவுகளின்படி ஆயுர்வேத மருந்துகள் தயாரிப்பில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மருத்துவப் பொருளான கண்டங்கத்தரி kg இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சந்தை விலையின்படி காய்ந்த கண்டங்கத்தரி ஒரு கிலோகிராம் சுமார் ரூ.750.00 இருக்கும்.

ஆக்கம்:  
வைத்தியர் லக்ஷாந்த குணசிங்க,  
ஆயுர்வேத சமூக சுகாதாரவைத்திய அதிகாரி-கங்கவட்ட கோரளை.

தமிழாக்கம்:  
வைத்தியர் எம்.எஸ்.எப். ஷப்ரார்,  
ஆயுர்வேத சமூக சுகாதார வைத்திய அதிகாரி-நாஉல.